

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Зіміна Ольга Вікторівна	Лаб. № замовлення	929502673
Дата народж.	25.02.1978	Код замовлення:	-
Стать:	Жіноча	Дата замовлення:	18.11.2021 11:24
Коментарі:	Відділення №103 м. Київ, вул. Щербаківського, 45-А		

Назва дослідження	Результат	Одиниці виміру	Референтні значення	Коментарі
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний Первинна проба: мазок назоорофарингіальний	не виявлено		не виявлено	

Заключення:

У зразку біологічного матеріалу, обстеженого швидким тестом для виявлення специфічних антигенів, не встановлена наявність антигену вірусу SARS-CoV-2.

У разі збереження підозри на інфікування, наявності ознак ГРВЗ чи проявів схожих на коронавірусну хворобу, рекомендується:


- дотримуватися заходів безпеки (користуватися засобами індивідуального захисту, дотримуватись соціальної дистанції);
- звернутися до лікаря та отримати рекомендації щодо повторного тестування із застосуванням іншого методу (RT-ПЛР з дослідженням того ж або іншого біоматеріалу).

Дане дослідження призначене для виявлення антигену вірусу SARS-CoV-2. Для оцінки імунної відповіді рекомендовані дослідження на виявлення антитіл.

Інформаційна підтримка Контакт-центру ДІЛА: 0 800 217 887.



Завідувач лабораторії
загальноклінічного аналізу



Несененко О.В.

ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ АНТИГЕНУ вірусу SARS-COV-2 призначений для виявлення/ідентифікації в зразку біоматеріалу (мазку з рото-, носоглотки) специфічного білка N, що належить вірусу

ДАНИЙ ВИД ТЕСТУВАННЯ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ:

- якщо Вам потрібна довідка для відвідування громадських місць;
- в країнах з високим рівнем поширення COVID-19;
- коли немає можливості здати тест ПЛР;
- особам, які перебувають у закритих колективах (інтернати, будинки для людей похилого віку);
- тим, хто піддається постійному ризику інфікування (медпрацівники, персонал лікарень, людям, що доглядають за хворими)*;
- в екстрених випадках (тяжкість перебігу не дозволяє чекати результатів ПЛР);
- за вимогою посольств для перетину кордону.

Результат	Є симптоми захворювання	Немає симптомів захворювання
Позитивний	Людина інфікована COVID-19, високозаразна для оточення. Рекомендується: • спостереження лікаря; • при наявності факторів ризику (вік, супутні хвороби/стани*) провести Комплекс «Оцінка стану організму при COVID-19»; • через 10-14 днів здати ПЛР тест.	Результат розцінюється як попередньо позитивний, якщо є дані: • про контакт з хворим COVID-19; • про перебування в місцях/країнах з високим ризиком інфікування; Для підтвердження необхідно здати ПЛР тест через 24 години (але не пізніше 48 годин).
Негативний	Може означати, що: • кількість вірусів у носоглотці нижче межі чутливості експрес тесту; • захворювання викликане іншими респіраторними вірусами; • при повторному взятті мазка через короткий проміжок часу (день в день або через добу), що зменшує кількість біоматеріалу в зразку і в свою чергу може призводити до негативних результатів. Рекомендується здати: • ПЛР тест на визначення SARS-COV-2**; • Скринінг для визначення 21 збудника методом ПЛР в тому числі грипу з використанням запатентованої європейської методики FTD ***.	Відсутність інфікування SARS-COV-2 Не виключає інфікування COVID-19 у випадках: • у тих, хто контактував з хворим, що має підтверджений COVID-19; • у тих, хто постійно контактує з хворими; • у тих, хто проживає у місцях з високим рівнем поширення коронавірусної хвороби*; • при повторному взятті мазка через короткий проміжок часу (день в день або через добу), що зменшує кількість біоматеріалу в зразку і в свою чергу може призводити до негативних результатів. При наявності цих факторів необхідно провести тестування методом ПЛР **.

* Фактори ризику визначені «Наказ МОЗ України від 28.03.2020 р. № 722» Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)»

** Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР-якісний, FTD (терміновий); Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР - якісний

*** Скринінг респіраторних інфекцій, ПЛР, 21 показник, FTD (високочутл.)

ВАЖЛИВО!

Негативний тест на антиген не є підтвердженням відсутності вірусу у зразку біологічного матеріалу.

ПЛР – високочутливий метод діагностики, який дозволяє виявити навіть невелику кількість вірусів у зразку мазка з рото-, носоглотки і визначити відносний рівень вірусного навантаження (кількість вірусів у зразку). Значення вірусного навантаження (ВН) є основним показником при оцінці заразності людини для оточуючих.