

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

|                                    |                                                    |                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Пацієнт: Кошкодан Ігор Миколайович | Лаб. № замовлення                                  | 929502672        |
| Дата народж. 07.07.1972            | Код замовлення:                                    | -                |
| Стать: Чоловіча                    | Дата замовлення:                                   | 26.11.2021 11:22 |
| Коментарі:                         | Відділення №103 м. Київ, вул. Щербаківського, 45-А |                  |

| Назва дослідження                                                                                                           | Результат   | Одиниці виміру | Референтні значення | Коментарі |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------|
| Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, швидкий тест для виявлення АГ, якісний<br>Первинна проба: мазок<br>назоорофарингіальний | не виявлено |                | не виявлено         |           |

### Заключення:

У зразку біологічного матеріалу, обстеженого швидким тестом для виявлення специфічних антигенів, не встановлена наявність антигену вірусу SARS-CoV-2.

У разі збереження підозри на інфікування, наявності ознак ГРВЗ чи проявів схожих на коронавірусну хворобу, рекомендується:

- дотримуватися заходів безпеки (користуватися засобами індивідуального захисту, дотримуватись соціальної дистанції);
- звернутися до лікаря та отримати рекомендації щодо повторного тестування із застосуванням іншого методу (RT-ПЛР з дослідженням того ж або іншого біоматеріалу).

Дане дослідження призначене для виявлення антигену вірусу SARS-CoV-2. Для оцінки імунної відповіді рекомендовані дослідження на виявлення антитіл.

Інформаційна підтримка Контакт-центру ДІЛА: 0 800 217 887.



Завідувач лабораторії  
загальноклінічного аналізу



Несененко О.В.

## ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ АНТИГЕНУ вірусу SARS-COV-2 призначений для виявлення/ідентифікації в зразку біоматеріалу (мазку з рото-, носоглотки) специфічного білка N, що належить вірусу

### ДАНИЙ ВИД ТЕСТУВАННЯ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ:

- якщо Вам потрібна довідка для відвідування громадських місць;
- в країнах з високим рівнем поширення COVID-19;
- коли немає можливості здати тест ПЛР;
- особам, які перебувають у закритих колективах (інтернати, будинки для людей похилого віку);
- тим, хто піддається постійному ризику інфікування (медпрацівники, персонал лікарень, людям, що доглядають за хворими)\*;
- в екстрених випадках (тяжкість перебігу не дозволяє чекати результатів ПЛР);
- за вимогою посольств для перетину кордону.

| Результат         | Є симптоми захворювання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Немає симптомів захворювання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Позитивний</b> | <p>Людина інфікована COVID-19, високозаразна для оточення.</p> <p><b>Рекомендується:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• спостереження лікаря;</li> <li>• при наявності факторів ризику (вік, супутні хвороби/стани*) провести Комплекс «Оцінка стану організму при COVID-19»;</li> <li>• через 10-14 днів здати ПЛР тест.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Результат розцінюється як попередньо позитивний, якщо є дані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• про контакт з хворим COVID-19;</li> <li>• про перебування в місцях/країнах з високим ризиком інфікування;</li> </ul> <p>Для підтвердження необхідно здати ПЛР тест через 24 години (але не пізніше 48 годин).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Негативний</b> | <p>Може означати, що:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• кількість вірусів у носоглотці нижче межі чутливості експрес тесту;</li> <li>• захворювання викликане іншими респіраторними вірусами;</li> <li>• при повторному взятті мазка через короткий проміжок часу (день в день або через добу), що зменшує кількість біоматеріалу в зразку і в свою чергу може призводити до негативних результатів.</li> </ul> <p><b>Рекомендується здати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПЛР тест на визначення SARS-COV-2**;</li> <li>• Скринінг для визначення 21 збудника методом ПЛР в тому числі грипу з використанням запатентованої європейської методики FTD ***.</li> </ul> | <p><b>Відсутність інфікування SARS-COV-2</b></p> <p>Не виключає інфікування COVID-19 у випадках:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• у тих, хто контактував з хворим, що має підтверджений COVID-19;</li> <li>• у тих, хто постійно контактує з хворими;</li> <li>• у тих, хто проживає у місцях з високим рівнем поширення коронавірусної хвороби*;</li> <li>• при повторному взятті мазка через короткий проміжок часу (день в день або через добу), що зменшує кількість біоматеріалу в зразку і в свою чергу може призводити до негативних результатів.</li> </ul> <p>При наявності цих факторів необхідно провести тестування методом ПЛР **.</p> |

\* Фактори ризику визначені «Наказ МОЗ України від 28.03.2020 р. № 722» Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)»

\*\* Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР-якісний, FTD (терміновий); Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР - якісний

\*\*\* Скринінг респіраторних інфекцій, ПЛР, 21 показник, FTD (високочутл.)

### ВАЖЛИВО!

Негативний тест на антиген не є підтвердженням відсутності вірусу у зразку біологічного матеріалу.

ПЛР – високочутливий метод діагностики, який дозволяє виявити навіть невелику кількість вірусів у зразку мазка з рото-, носоглотки і визначити відносний рівень вірусного навантаження (кількість вірусів у зразку). Значення вірусного навантаження (ВН) є основним показником при оцінці заразності людини для оточуючих.